

ଭା.କୃ.ଅ.ବୁ.ପ.- କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କପା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ନାଗପୁର
କପା ଚାଷ ପାଇଁ XXV (ପଚିଶତମ) ସାପ୍ତାହିକ ପରାମର୍ଶ

ODISHA		ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ବାସ୍ତବିକ ବର୍ଷା (ମିମି)					ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆନୁମାନିକ ବର୍ଷା (ମିମି)				
		ନଭେମ୍ବର					ନଭେମ୍ବର				
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	କୋରାପୁଟ										
	କଳାହାଣ୍ଡି										
	ବଲାଙ୍ଗିର										
ବର୍ଷ ପରିମାଣ ଓ ରଙ୍ଗ ସଂକେତ		୦.୧ ରୁ ୨.୪ ମିମି		୨.୫ ରୁ ୧୫.୫ ମିମି		୧୫.୬ ରୁ ୬୪.୪ ମିମି		୬୪.୫ ରୁ ୧୧୫.୫ ମିମି		୧୧୫.୬ ରୁ ୨୦୪.୪ ମିମି	
ବର୍ଷା ପ୍ରକାର		ଅତି ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା		ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା		ସାଧାରଣ ବର୍ଷା		ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା		ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା	

କପା ଫସଲ ଅବସ୍ଥା:

କପା ଫସଲ ଏବେ 147-157 ଦିନରେ ବକରା ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଫାଟିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ।ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କପା ଅମଳ କରିବା କାମ ଚାଲିଛି ।କପା ଫସଲରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଘାସ ଯଥା ସରୁ ପତ୍ର ଘାସ ଓ ବଡ଼ ପତ୍ର ଘାସ ରହିଛି ।ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଜଉ ପୋକ, ପତ୍ର ଡିଆଁ, ପତ୍ର ସୁତଙ୍ଗ ପୋକ ଓ ପତ୍ରଖିଆ ଲେଡା ପୋକ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ଜମିରେ ପଣି ଜମି ରହିବା କାରଣରୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଝଞ୍ଜଳା ରୋଗ ଲାଗିଛି ।କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଟଳ ବକରା ବିକ୍ଷା ପୋକ ଲାଗିଛି । ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ କପା ଫସଲରେ ପତ୍ର ଦାଗ, ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ପାତ୍ର ଦାଗ ଓ ପାଉଁଶିଆ ପାତ୍ର ଦାଗ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଛି ।

ପରାମର୍ଶ:

ଏବେ କପା ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବାରୁ, ଚାଷୀମାନେ କପା ତୋଳିବା ଉଚିତ । ଏଥିପାଇଁ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫୁଟିଥିବା ବକରାରୁ କପା ତୋଳିବା ଦରକାର । ତୋଳା ଯାଇଥିବା କପାକୁ ଭଲଭାବରେ ଶୁଖାଇ, କପଡାରେ ଡିଆରି ଅଖାରେ ସାଇତି ରଖିବା ଉଚିତ ।ପ୍ରଥମ ଥର ତୋଳା ହୋଇଥିବା କପାକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ସାଇତିବା ଦରକାର । ପତ୍ର ଡିଆଁ ପୋକ ଓ ଧଳା ମାଛି ଆର୍ଥିକ ତାହେଲି ସୀମା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ଏକର ପିଛା ୫୦ ଗ୍ରାମ ଫ୍ଲୋନିକାମିଡ 50 **WG** କିମ୍ବା 60 ଗ୍ରାମ ଡାଇନୋତେପ୍ଟରଣ **20SG** କିମ୍ବା 300 ମିଲି ଡୋଲ୍ଫେପୟରବ **15EC** ଔଷଧ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।ଯଉ ପୋକ ଓ ପତ୍ର ଡିଆଁ ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ୫ ଟି ହଳଦିଆ ଅଠାଳିଆ ଯନ୍ତା ଲଗାନ୍ତୁ । ପାଟଳ ବକରା ବିକ୍ଷା ପୋକର ଉପସ୍ଥିତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଡାଳକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦିଆନ୍ତୁ । ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା 5 ଟି ସାଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତା ବସାନ୍ତୁ । ପାଟଳ ବକରା ବିକ୍ଷା ପୋକର ସଂଖ୍ୟା ଆର୍ଥିକ ତାହେଲି ସୀମା (ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତାରେ 5-8 ପ୍ରଜାପତି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 3 ରାତିରେ ପଡିଲେ କିମ୍ବା ସବୁଜ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବକରା 10% ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ) ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 200 ମିଲି ଫେନଥଲରେଡ 20 କିମ୍ବା 200 ମିଲି ଲମ୍ବଡା ସାଇହଲୋଥ୍ରୁନ 5ଇସି କିମ୍ବା 250 ମିଲି ସାଇପାରମେଥରିନ 10 ଇସି କିମ୍ବା 100 ମିଲି ସାଇପାରମେଥରିନ 25 ଇସି କିମ୍ବା 200 ମିଲି ଦେଲତାମେଠରିନ 2.8 ଇସି କିମ୍ବା 120 ମିଲି ଅଲଫାମେଥରିନ 10 ଇସି ଅଭିଷଧକୁ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ଝଞ୍ଜଳା ରୋଗୋ ଦେଖା ଯିବାର 24-48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ଗ୍ରାମ କରବେନ୍‌ଜିମି 50%WP ସହିତ 10 ଗ୍ରାମ ଯୁରିଆ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ନାଲି ପତ୍ରଦାଗ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ 100 ଗ୍ରାମ ମାଗ୍ନେସିଆମ ସଲ୍ଫେଟ ସହିତ 100 ଗ୍ରାମ ଯୁରିଆ କୁ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । କବକ ଜନିତ ପତ୍ର ଦାଗ ଓ ଫଳ ଶତା ରୋଗର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ମିଲି ଅଫ୍‌ଜାକ୍ସିସୋବିନ 18.02 % + ଡିଫେନୋକୋନାଜୋଲ 11.4 % SC ଔଷଧ କିମ୍ବା ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ମିଲି ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ କିମ୍ବା 2.5 ଗ୍ରାମ ଥାୟୋଫାନେଟ ମିଥାଇଲ 70% WP କିମ୍ବା 0.4 ଗ୍ରାମ କର୍ବେନ୍‌ଜିମି 50WP କିମ୍ବା 2.5 ଗ୍ରାମ କର୍ବେନ୍‌ଜିମି 12% + ମକ୍ଲୋଜେବ 63% WP ଅଭିଷଧକୁ 15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ 2 ଥର ପତ୍ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଉନ୍ନତ କପା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯଥା ମୃତ୍ତିକା ଓ ବିହନ ଚୟନ, ସାର ପ୍ରୟୋଗ , ଚୁଣିବା ପଦ୍ଧତି, ଜଳସେଚନ ଓ ଘାସ ପରିଚାଳନା, ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଟୋଏଡ ଆଧାରିତ (ସିଆଇସିଆର କଟନ ଆପ (CICR Cotton App ଯାହାକି ଆଇସିଏଆର-ସିଆଇସିଆର, ନାଗପୁର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ରୁ ମିଳି ପାରିବ ଖୁବ୍ ଲାଭ ।

ଫ୍ଲୁ ସେର ରୁ ଏହି ଆପ କୁ ମାରଣରେ ଡାଉନଲୋଡ କରା ଯାଇ ପାରିବ ।ଏହା ଛଡା ଫସଲର ଅବସ୍ଥା ଓ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ ସାମ୍ବାହିକ ପରାମର୍ଶ ଗୁଡିକ ଆଇସିଏଆର-ସିଆଇସିଆର ୱେବ ସାଇଟ (<https://cicr.org.in/resource-weekly-advisory>) ରେ ଅପଲୋଡ କରା ଯାଉଛି, ଯାହାସବୁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳି ପାରିବ ।