

**ଭା.କୃ.ଅ.ବୁ.ପ.- କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କପା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ନାଗପୁର
କପା ଚାଷ ପାଇଁ XXVII(ସତେଇଶତମ) ସାପ୍ତାହିକ ପରାମର୍ଶ**

ODISHA		ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ବାସ୍ତବିକ ବର୍ଷା (ମିମି)					ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆନୁମାନିକ ବର୍ଷା (ମିମି)				
		ନଭେମ୍ବର					ଡିସେମ୍ବର				
		26	27	28	29	30	01	02	03	04	05
	କୋରାପୁଟ	0	0	0	0	0	0	1.9	0	0	0
	କଳାହାଣ୍ଡି	0	0	0	0	0	0	0.9	0	0	0
	ବଲାଙ୍ଗିର	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ବର୍ଷ ପରିମାଣ ଓ ରଙ୍ଗ ସଂକେତ		୦.୧ ରୁ ୨.୪ ମିମି		୨.୫ ରୁ ୧୫.୫ ମିମି		୧୫.୬ ରୁ ୬୪.୪ ମିମି		୬୪.୫ ରୁ ୧୧୫.୫ ମିମି		୧୧୫.୬ ରୁ ୨୦୪.୪ ମିମି	
ବର୍ଷା ପ୍ରକାର		ଅତି ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା		ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା		ସାଧାରଣ ବର୍ଷା		ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା		ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା	

କପା ଫସଲ ଅବସ୍ଥା:

କପା ଫସଲ ଏବେ 161- 171 ଦିନରେ ବକରା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅମଳ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ।ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କପା ଅମଳ କରିବା କାମ ଚାଲିଛି ।ପ୍ରାୟ ସବୁ କପା ଚାଷ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ସିଠୁଆ ଓ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିଛି । ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପତ୍ର ଡିଆଁ ପୋକ ଓ ଧଳା ମାଛି ପୋକ ଲାଗିଛି । କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଟଳ ବକରା ବିଷା ପୋକ ଲାଗିଛି । ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ କପା ଫସଲରେ ପତ୍ର ଦାଗ, ବାଜାଣୁ ଜନିତ ପାତ୍ର ଦାଗ ଓ ପାଉଁସିଆ ପାତ୍ର ଦାଗ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଛି ।

ପରାମର୍ଶ:

ଚାଷୀମାନେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫୁଟିଥିବା ବକରାରୁ କପା ତୋଳିବା ଦରକାର । ତୋଳା ଯାଇଥିବା କପାକୁ ଭଲଭାବରେ ଶୁଖାଇ, କପଡାରେ ଡିଆରି ଅଖାରେ ସାଇତି ରଖିବା ଉଚିତ ।ପ୍ରଥମ ଥର ତୋଳା ହୋଇଥିବା କପାକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ସାଇତିବା ଦରକାର । ପାଟଳ ବକରା ବିଷା ପୋକର ଉପସ୍ଥିତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଡାଲକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦିଆନ୍ତୁ । ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା 5 ଟି ସାଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତ୍ରା ବସାନ୍ତୁ । ପାଟଳ ବକରା ବିଷା ପୋକର ସଂଖ୍ୟା ଆର୍ଥିକ ତାହେଲି ସୀମା (ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତ୍ରାରେ 5-୮ ପ୍ରଜାପତି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 3 ରାତିରେ ପଡିଲେ କିମ୍ବା ସବୁଜ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବକରା 10% ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ) ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 200 ମିଲି ଫେନଥଲରେଡ 20 କିମ୍ବା 200 ମିଲି ଲମ୍ବଡା ସାଇହଲୋଥୁନ 5ଇସି କିମ୍ବା 250 ମିଲି ସାଇପାରମେଥରିନ 10 ଇସି କିମ୍ବା 100 ମିଲି ସାଇପାରମେଥରିନ 25 ଇସି କିମ୍ବା 200 ମିଲି ଦେଲତାମେଠରିନ 2.8 ଇସି କିମ୍ବା 120 ମିଲି ଅଲଫାମେଥରିନ 10 ଇସି ଅଭିଷଧକୁ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । କବକ ଜନିତ ପତ୍ର ଦାଗ ଓ ଫଳ ଶତା ରୋଗର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ମିଲି ଆଜୋକ୍ସିସ୍ତ୍ରୋବିନ 18.02 % + ଡିଫେନୋକୋନାଜୋଲ 11.4 % SC ଔଷଧ କିମ୍ବା ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ମିଲି ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ କିମ୍ବା 2.5 ଗ୍ରାମ ଆୟୋଫନେଟ ମିଥାଇଲ 70% WP କିମ୍ବା 0.4 ଗ୍ରାମ କର୍ବେନ୍‌ଡାଜିମ 50WP କିମ୍ବା 2.5 ଗ୍ରାମ କର୍ବେନ୍‌ଡାଜିମ 12% + ମଙ୍କୋଜେବ 63% WP ଅଭିଷଧକୁ 15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ 2 ଥର ପତ୍ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଉନ୍ନତ କପା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯଥା ମୃତ୍ତିକା ଓ ବିହନ ଚୟନ, ସାର ପ୍ରୟୋଗ , ବୁଣିବା ପଦ୍ଧତି, ଜଳସେଚନ ଓ ଘାସ ପରିଚାଳନା, ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଟୋଏଡ ଆଧାରିତ (ସିଆଇସିଆର କଟନ ଆପ (CICR Cotton App ଯାହାକି ଆଇସିଏଆର-ସିଆଇସିଆର, ନାଗପୁର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ରୁ ମିଳି ପାରିବ ।
ମୁଗଲ ଫ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ରୁ ଏହି ଆପ କୁ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ କରା ଯାଇ ପାରିବ ।ଏହା ଛଡା ଫସଲର ଅବସ୍ଥା ଓ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ ସାପ୍ତାହିକ ପରାମର୍ଶ ଗୁଡିକ ଆଇସିଏଆର-ସିଆଇସିଆର ୱେବ ସାଇଟ (<https://cicr.org.in/resource-weekly-advisory>) ରେ ଅପଲୋଡ କରା ଯାଉଛି, ଯାହାସବୁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳି ପାରିବ ।